

FORESTACIÓN EN PLANICIE DE INUNDACIÓN

Segun punto 4.2.1 inciso c de ordenanza 255/18

CEIBAL

Es uno de los bosques caducifolios higrofilos de la region con predominancia de ceibo. Suele ocupar suelos anegadizos en riberas o bordes de lagunas. Constituye una etapa intermedia entre los pajonales y la selva. Este bosque pertenece a la provincia fitogeografica paranaense. Acompañan el ceibo las siguientes especies, entre otras:

Arboles mas frecuentes:

Salix humboldtiana - Sauce criollo.
Sapium haemospermum - Curupí.
Blepharocalyx salicifolius - Anacahuita.
Cephalanthus glabratus - Sarandi colorado.
Terminalia australis - Palo amarillo.
Eugenia uruguayensis - Guayabo blanco.

Arbustos mas frecuentes:

Aeschynomene montevidensis - Algodonillo.
Equisetum giganteum - Cola de caballo
Hibiscus striatus - Rosa de rio.
Mimosa bomplandii - Mimosa; rama negra.
Myrceugenia glaucescens - Murta.
Phyllanthus sellowianus - Sarandi blanco
Sesbania punicea - Ceibillo.
Sesbania virgata - Rama negra.

Trepadoras mas frecuentes:

Anredera cordifolia - Brotal.
Araujia sericifera (*A. hortorum*) - Tasi.
Cissus striata - Uvilla del diablo.
Clematis bonariensis - Cabello de angel.
Dioscorea sinuata - Carapé.
Araujia odorata (*Morrenia odorata*) - Tasi.
Passiflora caerulea - Mburucuyá, pasionaria.
Tropaeolum penthaphyllum - Flor de pitito.

Hierbas mas frecuentes:

Echinodorus grandiflorus - Cucharero.
Eryngium pandanifolium - Caraguatá.
Ludwigia bonariensis. Onagraceae.
Pontederia cordata. Pontederiaceae.
Sagittaria montevidensis - Saeta.
Senecio bonariensis - Margarita de bañado.

SAUZAL

Comunidad tipica de sitios húmedos, de la provincia paranaense con predominio de especies caducifolias, que a diferencia del ceibal, suele ser menos densa.

Crece junto al sauce criollo (*Salix humboldtiana*) de las siguientes especies:

Arboles mas frecuentes:

Cephalanthus glabratus - Sarandi colorado.
Myrsine parvula (*Rapanea lorentziana*) - Cabelón.
Sapium haemospermum - Curupí.

Arbustos mas frecuentes:

Aeschynomene montevidensis - algodonillo.
Equisetum giganteum - cola de caballo.
Escallonia megapotamica var. *spiraefolia*.
Hibiscus striatus - Rosa de rio. Malvaceae.
Mimosa bomplandii - mimosa; rama negra.
Myceugenia glaucescens - Murta.
Phyllanthus sellowianus - Sarandi blanco.
Sesbania punicea - Ceibillo.
Sesbania virgata - Rama negra.

Trepadoras mas frecuentes:

Anredera cordifolia - Brotal. .
Araujia sericifera (*A. hortorum*) -Tasi.
Cayaponia bonariensis. Tayuya.
Cissus striata - Uvilla del diablo.
Clematis bonariensis - Cabello de angel.
Araujia odorata (*Morrenia odorata*) - Tasi.
Muehlebeckia sagittifolia - Zarparrilla colorada.
Passiflora caerulea - Mburucuyá, pasionaria.

Hierbas mas frecuentes:

Echinodorus grandiflorus - Cucharero.
Eryngium pandanifolium -Caraguatá.
Ludwigia bonariensis.
Ludwigia peploides.
Pontederia cordata.
Sagittaria montevidensis - Saeta.
Senecio bonariensis - Margarita de bañado.

